長壽

于右任

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

每份四分　第九十二期

中華民國二十三年三月九日

每逢星期五出版　全年五十期　連郵二元　國外加倍

館址　上海三馬路雲南路口幸福書局內

◎內政部登記證警字第一一二七號◎

◎本報特聘請 吳之屏 方家楨 大律師爲常年法律顧問◎

□本期目錄

□卷頭語
吃飯問題
□性的常識
手淫之警告
糖尿病的簡易診斷和攝護法
□胎產常識
經閉病與妊娠之辨別法
產婦衛生常識
□長篇專著
瘧疾自療法
□醫藥研究欄
凍瘡膏之討論
□育兒常識
小兒驚風及治法
小兒的仇敵
□實用驗方
肺病神方
橄欖的效用
火燙水燙奇效方
豬膽治疔有特效
漆瘡治法
去痣法
芭蕉汁治癒疔瘡之二例
□用藥指南
香蕉藥性之淺解

吃飯問題

(涼月)

我鄉有句諺語「早飯要吃得早。中飯要吃飽。晚飯要吃得少」這實在很有至理。何奈現在的人。尤其是上海人。對於吃飯問題。簡直不衛生到極點了。早晨起身。總要十點或十一點。吃了早飯。不到片刻。又要吃中飯了。胃部的消化。那裏來得及呢。以致發生胃部消化不良病症的人。很多很多。至於吃了晚飯之後。却要到深更半夜。還不睡覺。唉。吃飯的時間。沒有一定次序。無怪乎中國人的身體。要一天弱一天呢。

幸福書局出版醫藥新書
地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

求孕與避孕　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

腎病研究　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

百病秘方　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

保腦新書　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

胎產問題　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

長篇專著

□瘧疾自療法(十五)

朱振聲

瘧疾醫案選粹

(三)三陰大瘧正虛邪伏

三日瘧已延半載。發時戰寒壯熱。歷十小時始衰。納穀漸少。面色痿黃。脉象沈弦無力。苔薄膩。此正氣已虛。邪伏三陰。榮衛循序失司。纏綿之症。宜扶正達邪。用陽和陰。

炒潞黨參錢半　柴胡八分　生甘草六分
仙半夏二錢　川桂枝六分　熟附片一錢
炙鼈甲四錢　青蒿梗錢半　鹿角霜三錢
茯苓三錢　陳皮一錢　焦穀芽四錢
生姜二片　紅棗四枚

二診　前方服六劑。寒熱即止。接服六君子湯。加草菓。姜。棗。

(四)但熱不寒發於日暮

伏邪久蘊。消耗陰液。臨晚身熱。至夜半而減。已延數月。咳嗆。咯痰不爽。納少。形肉消瘦。苔薄黃。脉弦滑而數。少陰之陰已傷。陽明之邪不解。書云。但熱不寒。名曰癉瘧。積久不愈。即爲癆瘧也。

潞黨參錢半　生甘草六分　青蒿梗錢半
炙鼈甲三錢　川貝母三錢　熟石膏三錢
仙半夏錢半　銀柴胡一錢　冬瓜子三錢
茯神三錢　嫩白薇錢半　大荸薺五枚
焦穀芽四錢

(五)感冒挾痰瘧發納減

夏傷於暑。以榮爲舍。秋冒風涼。與衛併居。涼者。陰邪也。陰欲入而陽拒之。陰併於陽。則陽虛而陰盛。陰盛則寒。暑者。陽邪也。陽欲出而陰格之。陽併於陰。則陰虛而陽盛。陽盛則熱。是以先寒慄鼓頷。而後壯熱頭痛。依時而作。汗出而解。日日如是。已有兩旬之久。胸悶不思飲食。舌苔膩布。脉象弦滑。弦爲少陽之脈。滑爲痰濕之徵。邪伏少陽。痰濕阻於募原。無疑義矣。擬清脾飲加減。和解樞機。蠲化痰濕。

□保腦丸之發明

發明保腦丸者。非醫家乃病家也。病家無醫藥知識。何以能發明。曰。從實驗中得來。當其患腦病劇烈之時。中西名醫。百治無效。後無意中服此藥。覺效。于是有此丸之發明。

□保腦丸之功效

余戚某氏。亦患腦病。始則鼻流濁涕。腦昏目糊。繼而記憶薄弱。精神不振。即以此藥試之。不數日而愈。其功效之神速。非他藥所可比擬。

□保腦丸之服法

保腦丸之服法。極爲簡便。既無煎煮之勞。而且攜帶便利。祇須在飯後用白開水呑服三錢。小兒減半。

□保腦丸之價目

保腦丸祇有一種。每盒大洋五角。不折不扣。每打五元。外埠函購。起碼二盒。寄費另加二角。

廣東鄭震發明
上海幸福書局代售

性的常識

手淫之警告 （淇）

昔岐伯有言曰。上古之人。其知道者。法於陰陽。和於術數。飲食有節。起居有常。不妄作勞。故能形與神俱。而盡終其天年。度百歲乃去。今時之人不然也。以酒爲漿。以妄爲常。醉以入房。以欲竭其精。以耗散其眞。不知持滿。不時御神。務快其心。逆於生樂。起居無節。故半百而衰也。由是可知色慾之害人。眞不啻白刃而戕人之生命。嘗言患肺病之人。其傷於女色者十居八九。余見青年子弟。其所處境遇。並非過於勞心。而其人乃非常瘦弱。頭痛。腰痠。腿痠。貪眠。行動無力。爲之父母者。非以其勞心太過。則以其運動缺少。非以其飲食不足。則以其先天有虧。並不疑及手淫之故。於是專注意於補品。抑豈知補品皆係提激之物。服補品愈多。則慾心愈盛。而手淫愈甚。至此時期。相火旺而腎水虧。爲之父母者。不此之察。此際又藥亂投。是非治其病。實促其死也。茲將手淫之病。畧述於下。使世之爲子弟者。知此病之劇烈。未染此病。當自防範。既染此病。愼爲醫治。

病理 凡患手淫不能自制者。因日久後。其尿脂後段盤血。知覺過於靈敏也。

病狀 常有一種含羞之狀。多夢。煩擾。頭痛。頭暈。眼痛。疲倦。血虧。大小腿之肌肉無力及痠痛。記憶力喪失。手易發抖。體重減輕。其中最明顯之病狀。即記憶減低是也。

診斷 有手淫之人。常不願自己承認。至醫士處。常言頭痛。胃閉。及有一種不解之腦部病狀。或靈性病狀是也。若以手指探入肛門。察其胱底柵。其知覺過靈。此爲最要之診斷法。

預防法 不使與較大頑梗之小孩作伴。在德國學校學生讀書時。其兩手必須置於書桌上。褲子不能有义袋。能磨擦兩腿之體操。不能用。於睡眠之前。當屙盡其尿。晚餐宜少食液體食物。被不可多蓋。亦不可過軟。早晨一醒。即宜屙小便。匹膀胱滿尿。或被太多太軟。陽鑿易於高舉。易引起手淫也。

治法 胱底柵部。用推拿法。於尿滿膀胱時。醫者以手指入肛。柔和推拿之。其時間按其感覺而定之。若能忍受。可多加時剗。若不能忍受。可減少時剗。推拿後。使之屙尿。

糖尿病的簡易診斷和攝護法

（日本佐佐廉平著 毛新甫譯）

羅病者的常食

將以上就三大滋養素綜合言之。糖尿者的日常食品。米飯（又其他的澱粉性食品）的適量（鍋間六合以上）（均以無礙爲度）各種肉類。鷄卵。稍多量的脂油。以上爲其主食。其他如菜蔬亦大抵適宜。惟含糖類多者。應將其分量限制。豆類以含有澱粉的原故。是又要幾許的限制。其他含菜蔬雖總含有多少含水炭素。比較的無害。至若有腹滿的感覺時爲限。也可以食的，果實則糖分多的（香蕉葡萄。柿等）應該避免。梨。蘋果。柑等可少量的食。落花生。核桃。柚。無花果等。爲最適宜。就一般害糖尿病者食量不可過多。甯少食些。以至使體重（與其人相應）總能維持而止爲宜。

最輕証的糖尿。一日三食內之。一食（通例朝食）注意澱粉及糖之節制便可。此外三食也應共爲注意。若稍重的証。其一回無礙的米飯量在半碗以下者。當於一定期間例如一—二週。將米飯。麵飽其他澱粉的食料全廢。爲耐抗力（食而無傚的量）增加的試驗。若重証入院養生爲耐抗力極少的人。例如食少許的米飯而糖尿即排出者行「般司令」注射。同時食一定量的米飯。這時候。須先行入醫院而後自己攝護。該請醫生的指導。

（未完）

朱振聲醫士

上海新新公司常年醫藥顧問

上海世界書局常年醫藥顧問

診例

（甲）門診一元 號金不取

（乙）出診四元 路遠遞加

（丙）膏丸方四元 隔日取件

（丁）外埠問病二元 原班回件

（戊）急病隨請隨到

時間 門診上午九時至下午四時止 出診四時以後

診所 上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話 九一四九二

掛號處啓

胎產常識

經閉病與妊娠之辨別法

婦女病因爲有胎前產後經帶諸疾。所以較男子爲難治。而其中尤以經閉病與妊娠最難辨別。因爲經閉病爲月經停止。妊娠亦爲月經停止。假使誤經閉病爲妊娠。而投以安胎之藥。則瘀必內阻。若誤妊娠爲經閉病。而投以祛瘀之品。則胎必下墮。其中錯以毫厘。謬以千里。今以經閉病與妊娠之辨別法。分述於后。

妊娠

（一）凡月經停閉以後。乳房脹大。乳頭呈紫褐色。嘔吐惡心。喜食酸味。心胸憒悶。不欲飲食。四肢乏力。頭重目眩。無其他病象者是。

（二）胎兒躍動。脈息滑利。或用聽診器聽孕婦之腹。覺有胎兒心臟聲音者是。

（三）或脈症不顯明者。用中藥生川芎一錢爲末。煎艾湯沖服。閱三四小時。腹中微動者是。

經閉病

（一）凡月經停止。而由於過食生冷之物者是。

（二）經止後而腹部脹痛者是。

（三）經止後。腹不脹痛。而並無妊娠之象者是。

產婦衛生常識

一、總說

產婦死亡原因 我們沒有受過教育的婦女。對於衛生常識。向來是不講求的。尤其關于懷孕和生產的時候。常常迷信舊說生理自然的變化。又不明瞭新式助產的約學接生法。所以產婦的死亡約占千分之三十五。初生嬰兒的死亡。竟占四分之一。假設產婦能注意到衛生常識而實行。家庭方面亦能了解接受合於科學的新式助產方法。那末這一筆寃枉的死亡。可以避免的。以下就是關於產婦衛生的正文。

二、產前衛生

△A懷孕 已婚的青年女子受孕是自然的現象。算不是一種疾病。這一點須特別了解。不要誤會。中國一般婦女。不知孕婦衛生常識。所以常常誤食藥物。以致發生很多病狀。但也有許多的疾病。是可以預防或治療的。甲。懷孕與婦女身體的影響。懷孕後的婦女身體。各部增加工作。如母體與胎兒之營養之排洩等。故母親須有充分的營養和休息。乙。懷孕的期限（一）平均二百八十天或九個月零七天（二）計算預產期。按末次經期來的日子起。加上九個月。然後再加七天。如末次月經起自二十一年九月二十二日。加上九月二十二日。加上九個月零七天。就是二十二年六月二十九日左右。丙。受孕之徵兆 一。月經停止青年結婚女子。月經素日正常。一旦停止。有懷孕之可疑。應即就醫診斷是否受孕。二。朝痰 孕至二三個月時。有微暈嘔吐之狀故早晨可先食少許食物。緩緩起床。以防暈吐。三。乳房變化 初婚懷孕在三四個月後。乳房漸漸漲大而硬。同時乳頭變黑紫色。並能擠出淺黃色的稀薄乳汁。四。小便次數增多 懷孕在三四個月後。因爲子宮漲大膀胱受壓的緣故。所以小便次數增多。孕至六個月時子宮漸升入腹腔。膀胱所受之壓力減輕。至臨產期。因胎兒下降膀胱復受壓。而小便又勤了。五。局部變化。甲。乳頭變成黑紫色。乙。腹皮有裂痕。並變褐色裂紋。丙。女陰變成深黑紫色。六。腹部漸次漲大和胎動 自三個月後腹部漸漸增大。並於五個月時。腹部有胎動。七。醫師診斷五個月以後的胎兒。能聽出胎心及捫得胎兒的方位。

△B。孕期的衛生 （甲）飲食應易於消化及營養充分的食物。一。植物米麵。疏菜。如白菜。菠菜。胡蘿蔔。豆類。西紅柿等。二。動物鷄鴨魚肉類等。每日一次。不可過多。以防胃的工作過勞。易得孕期血中毒。三。菓品棗子蘋果橘子梨桃等。均有益於身體。四。水多喝。白開水每天宜飲八大杯。五。忌食。甲。富于刺激性的飲食。如煙酒濃茶咖啡辣椒等。乙。孕婦不宜常服藥。（乙）衣服。衣服宜寬大輕鬆。重力懸在肩上。胸腰二部。不宜束緊。圍腰可用以托腹。（未完）

用藥指南

朱振聲

(五十八) 香薷(味辛微寒入肺與胃)

□主霍亂水腫　霍亂之症。由於正氣不足。暑邪乘虛而入。但暑邪含有濁氣。則邪正相爭。吐瀉不止。而且腹痛。香薷辛能發表。溫能散濁。則玄府開。暑邪逐。吐瀉止。水腫之疾。由于丹田之氣不足。不能蒸發膀胱氣化。而水聚焉。香薷能發表。開腠理。則水由玄府出。腫自消。經所謂開鬼門是也。

□理暑氣腹疼　暑邪濁氣。由口入內。邪正相爭。則爲腹痛。香薷辛能發散解表。且有香氣。能辟濁氣。功效甚偉。

□性宜通而利濕　香薷辛溫之品。善宣通腠理。則玄府開。肌表之濕。自可利矣。

□散蒸熱於皮膚　邪入皮膚。則毛竅閉。熱蒸于內。暑爲陽邪。故而蒸熱。香薷辛能開腠理。則邪由毛孔出。邪出則熱退。陰暑則可。陽暑則否。

楊尊賢編 營業指南

▲保證成功而滿意

商人欲謀生意發達。穩妥賺錢。惟有速購

茲將本書內要目舉略如下

店主的公正與待遇……
店員的責任與盡心……
生意上的三個要件……
做生意的條規……
進貨上的幾種問題……
進貨與退貨之手續……
接待顧客時的注意點……
應付買客的新花樣……
失去顧客惠顧的理由……
營業經驗與能力……
生意如賭博……
商人經歷談……
預計一年推銷內方法……
怎樣可以推廣銷路……
商業的書信……
商品的陳列與裝飾……
營業的法術……
買客的心理……
商店之靈魂……
經營宜試驗……
小裏能做大……
貪小必失大……
貿易三要訣……
倘有目錄不克備載
全册一册特價祇收大洋二角寄費加一總發行所上海三馬路雲南路幸福書局(郵票十足通用)

▲▲長壽報彙訂

□今日出版

長壽報彙選第一集　每册實售大洋六角

長壽報彙訂第二集　每册實售大洋五角

長壽報彙訂第三集　每册實售大洋五角

長壽報彙訂第四集　每册實售大洋五角

以上四集合購祇收一元五角外埠寄費不收

(附告)此四集彙訂。即長壽報第一期起至第七十五期止。計一年半。原價三元。現在祇收半價。欲購從速。

上海三馬路雲南路 幸福書局發行

幸福書局代售各種良藥

地址 上海三馬路雲南路轉角

遺精敵　有夢而遺　無夢而洩　久患新起　服之如神　每盒大洋一元

保腦丸　用腦過度　鼻流濁涕　腥臭異常　一服即愈　每盒大洋五角

白濁丸　白濁初起　溺管刺痛　止濁定痛　效如桴鼓　每盒大洋一元

吐血靈丹　肝火犯肺　肺絡損傷　痰紅吐血　服之立止　每盒大洋五角

獺肝定痛散　女子憂鬱　肝病時發　獺肝定痛　靈驗無比　每盒大洋四角

醫藥研究欄

□凍瘡膏之討論

(薛定華)

凍瘡一症。多見於冬季。因嚴冬之時。外界空氣寒冷。耳及四肢。時受刺激。皮下組織起異常狀態。則血行障礙。微管鬱血。則凍瘡成矣。故初起之時。鬱血部分發生水疱。(皮膚粗糙之部屢生皸裂Rhagade 而出血)皆由鬱血更滲出而起。呈腫脹狀。甚則成爲潰瘍也。然因余對于是問題。早存疑問也。其動機發生于醫藥研究會製藥組試製凍瘡膏時。以松香黃占同麻油煎熬而成。爲治已潰凍瘡之外敷劑。當時許多同道。談及黃寶忠先生。有至驗凍瘡膏之秘方。每年製成施送。結果非常靈驗。但未知以何藥配成。據云方以涼性藥不以溫藥也。余聞之之後。多方參攷。終未有見以涼藥治凍瘡也。近據友人潘君告示凍瘡膏一方。是方乃他家所秘傳。其配伍皆用涼藥。外敷治凍瘡發炎腫痛。頗有效驗。余喜而錄之。以供諸同學之研究也。方列后

凍瘡膏

側柏三兩　黃柏二兩　茄根二兩　楝樹果二兩　冬瓜皮三兩　梅片三錢　川連一兩　連翹二兩　甘遂二兩　黃芩二兩　甘草一兩　五倍子一兩

右味共研極細末。勿洩氣。加陳黃酒少許。麻油調外敷。治凍瘡腫赤疼痛或潰爛。是方之藥物配伍。性皆寒涼。有消炎之功。收斂之能。但余未經試驗。始終懷疑不決也。適昨閱京江趙竹泉先生所編著之內外驗方秘傳一書。中有治凍瘡一方。所配藥味。與余友所述者大同小異。亦用涼藥。今又錄于下。與、以供參考證也。

趙竹泉先生凍瘡驗方(側柏三錢　茄根黃柏各二錢　蠶豆葉三錢　楝樹果二錢　冬瓜皮三錢　甘遂二錢　川連一錢　鴿屎二錢　黃芩二錢　蛤粉灰三錢　甘草一錢)曬乾爲末以陳酒姜汁蜜和敷。

以上兩方之比較。藥味之去入。不過蠶豆、鴿屎。蛤粉灰。冰片。連翹。五倍子等味。但兩方之本性。各仍有消炎之功。經我友之試驗。及趙氏之經驗。是二方確有可取。蓋凍瘡雖因寒而生。但當其局部發炎時。非涼藥消其炎不爲功。正合黃先生之說也。故陽和膏。僅治其最初時有效。是二方治凍瘡腫赤疼痛。爲最宜。潰後顧其收斂著。余以爲其效甚微。余希望各同學。有見患凍瘡者。與以一試。

楊尊賢編 家庭須知 初續兩集

▲有主持家政之方法
▲有夫妻愛情之條件
▲有男子選妻之標準
▲有女子擇夫之訣門

上卷家庭問題
主婦治家的常識和技能……
晚餐後的家庭娛樂……
新家庭……
家庭職務的分配……
免除家庭負責的痛苦……
家庭屑庸之方法……
治家的碎語……
姑媳不和之原因……
怎樣主持家政……
家庭中的和睦談……
怎樣救濟中等家庭……
家庭娛樂的設施……
怎樣維持家庭生活……
衣食住之方法……
教子女……
訓練兒童九種之方法……
育嬰常識……
育兒與育女……
養成兒童良好習慣……
怎樣做主婦……
家庭生活謠歌……

中卷夫妻問題
夫婦合作與生產……
持維家庭夫婦和平……
怎樣做一個安分的丈夫……
怎樣做一個賢淑的妻子……
怎樣對付傲慢的丈夫……
怎樣去待丈夫……
怎樣去待妻子……
怎樣去待懶惰之丈夫……
怎樣去待暴棄自甘之夫……
怎樣去待失業之丈夫……
怎樣可免丈夫之物豁……
做妻之道……
鄉下夫妻生活寫實……
夫妻間的約法三章……
學作人而後嫁……
我的小家庭……
新家庭夫妻之要件……

下卷婚姻問題
婚姻的研究……
(一)定婚……
(二)成婚……
(三)離婚……
怎樣去選妻子……
怎樣去擇配偶……
適當與不適當的結婚……
我的婚姻主張……
現代女子婚姻目標……
離婚的避免……
結婚第一夜的見解……
婚姻的分析……
男女婚嫁之注意點……
研究結婚之種種……
婚姻須猶豫期之規定……
(尚有目錄不克備載)

全書二册特價祇收大洋四角寄費加一總發行所上海三馬路雲南路幸福書局(郵票十足通用)

育兒常識

小兒驚風及治法

徐惠之

驚風之名多矣。前人每斥爲不經。然相沿已久。愚夫愚婦均知之。似不妨用其名稱。最烈者。莫如急慢驚風。通常以抽搐戴眼者。爲急驚。吐瀉久而成瘛者。爲慢驚。急驚用藥宜凉。慢驚用藥宜溫。前論之詳矣。玆不贅述。但此外更有極惡劣者四種。一。嗒嘴。二。弄舌。三。唇舌發黑。四。手足凉熱不同。旣見種種驚風之象。復見此四種惡候者。其病之險惡。異乎尋常。雖未見抽搐。然斷定是凶多吉少之症。此外更有種。一。不發熱。不惡寒。僅目光直視。啼哭低緩。或亦能照常笑哭。惟神志氣息。總不靈敏活潑。此類症候。最不易體察。亦不易治療。而機警之乳母。常抱在懷。自能覺着。經驗較富之醫生。觀其形狀。亦能領會。患此病之孩。年在二三歲者爲最多。且多肥胖之兒。面色血脉。與常兒無異。每令醫生心中迷惑不定。致用兩可之藥。聊爲嘗試。求一對於此等症候到眼。即有把握之治法者。截止今日爲止。無論何地。實所鮮見。蓋小兒不能言語。家中人所述病情。每多模糊。其脉象又全無憑據。不特三部九候之不能清晰。即喜笑啼哭。脉亦爲之變動。故無論急驚慢驚。惟有察其面色。聽其聲音。問其二便。按其胸腹。再察其舌苔口氣。互相參考。其表裏寒熱虛實方能了然心中。對症用藥。自不患其無効也。若病始發而輕者。須用芳香之劑。先制其木。木定則何患成驚風。然已現惡者。(嗒嘴弄舌。唇舌。發黑。手足凉熱不同。)當以熄風平肝法。先救其急。如抱龍丸之類。繼以青肅其餘。庶爲標本皆治。此雖極爲簡易。盡人知之。但治病不難于用藥。而難于診斷。觀今世之治病者。每每拘泥成法。得其實確病情。而輕于用藥。致傷于驚風者。比比皆是。吾濟忝司民命。可不審慎歟。

小兒的仇敵 (續)

(晨隱)

小兒的傳染病

沙眼　爲容易傳染的眼病。亦因不潔而起。患者多從手巾等物傳染而得。患者眼瞼內面發生沙粒狀而覺乾痛。不容易治愈。宜速醫治。

痘瘡　別名天花。爲小孩容易的傳染病。患者百人中約有五十人不幸而死亡的。調理不善。則成麻臉。甚或爲痘瘡眼。俗稱天花回毒。幸而種痘的方法。他國早已發明。但不及現在種牛痘的爲穩妥。倘有知識未廣的人民。仍信用舊法。應當早日覺悟的。

牛痘種後。約有一年間的有効期。有謂須要連種六年。或一年二次。二年一次。纔有功効。

種牛痘的經過。無甚大避忌。唯種痘苗處的局部。不使受水濕及擦傷。襯衣以清潔柔和爲佳。飲食物亦須取其易於消化的。若痘胞因癢搔傷而腫。恐將腐爛。早請醫診察。免得拖延爲累。奏功甚遲。不可不注意。(完)

問病須知

(一)本報醫藥顧問欄。近因問病函件。積壘如山。仝人等雖日夜答覆。一時質難淸理。對於以後問病函件。不得不另訂新章。以示限制。

(二)今後如定戶欲問病者。本埠須附郵五角。外埠一元。以示限制。至函恕不答覆。非定戶本埠一元。外埠二元。問病者須詳述「男女性別」「何時起病」「經過治療」「現在症狀」方能處方答覆。而不致有誤也。

(三)凡定戶來函問病時。除照章納費外。並須寫明定單號碼。否則。作非定戶論。

實用驗方

肺病神方

白光歧

肺病最難治。西醫到現在還沒有發明療肺的良藥。一到第三期。便委爲不治之症。束手無策了。

然而每每有種驗方。有不可思議的效力。或許會把沉疴治好。下面的幾個法子。均有特殊的功能。患肺病的朋友。何妨試試呢。

【一】每天早晨起身。服荳腐漿一碗。晚間臨睡時。服枇杷膏三錢。開水冲飲。天天勿間斷。到病好纔停止。

【二】每天清晨。用荳腐漿冲服白芨粉三錢。也有很大的功效。

【三】採生白菓。浸好菜油內。愈陳久愈好。吃時。剝去殼。搗爛。用芥菜滷冲服。每日早晚服兩個。連服三天。其病若失。

橄欖的效用

成軒

橄欖又名餘甘，牠的效用除了消耗品之外。還可以吃了避免冬令的煤毒。因爲牠有消滅煤毒的能力。近來中煤毒的事情很多。不妨嘗試嘗試。

火盪水盪奇效方

【佚名】

雞蛋白三個。和火油三匙，打勻。以錫箔入內蘸之。蒙錫方面。貼盪傷處。乾則更換。卽飲上白濃糖湯一碗。能免毒氣攻心，自可漸愈。無論皮破起泡。均可蘸貼。立見奇効。如盪處過多。照法增加成分。痛甚再蘸火油揉之。屢試屢驗。並須忌口。曾有火盪水盪之人。他法不効。徒延時日。用此方後。旋卽霍然。倘盪後神識昏迷。奄奄一息。急用此方。亦可救活。

猪膽治疔有特效

【白虹】

友人孫君。指上忽紅腫。痛極。或云係疔毒。後由鄰人傳一單方。取猪膽稍破一口。將指套入。以線紮之。初指頭覺甚涼爽。睡一夜後。紅腫全消。特錄出以公大衆。

漆瘡治法

(邵叫飛)

此症木形人患者最多。發無定處。初則搔癢。抓之則形似抽皮。日久則潰爛如黃水瘡然。初用皂礬無名異水煎洗。又黃柏兒茶水粉硃砂名異煅石膏各等分共研細末。麻油調抹甚效若身有發熱。宜服化斑解毒湯去人中黃。方卽升麻石膏連翹牛旁甘草黃連知母元參水煎服。或用醋酸鉛一【西藥名】。淸水一大碗化洗。又用綿花醮罨其效甚捷。潰爛甚者。黃連膏貼之。兼摻生肌散。過皮全愈。

又方毛蟹一個。剖開入明礬末少許。陰乾。臨用時研末。麻油調敷效。愈後發癢者。用千分之一昇汞(西藥)水洗。止癢甚效。(昇汞有劇毒和水不可過多愼之愼之)

去痣法

(前人)

痣子多發於面部。有一粒至數十粒者。患者甚不雅觀。欲脫去之。宜用發煙硝酸。(西藥)用木條醮點於患處。立卽發痛。至數日痣則脫落。此法甚驗。(硝酸有劇毒宜愼用口眼之處須防沾滲用量宜少)

芭蕉汁治癰疔瘡之二例

【謝叙仁】

外科中有朝患暮死者。每陷于難治危險之程度。醫生窮於應付者。厥爲疔瘡。我人在臨床上。時常所遇到的與該症之由來。完全係濕熱與風邪擾動。發無定處。尤以面部更形劇烈。臺腫痲木或疼痛。甚則身熱不醒。設不早爲治療。每易致走黃而死。上月內有王某及某鄉婦。一患額疔。一患唇疔。癰甚。一痲癢無疼。疔頭黑腐。身熱神昏。言語舛錯。已呈走黃且極危重狀態。該症於事實上非服藥不可。無奈二人皆係勞工無力服藥。情殊可憐。余幾爲束手。忽憶昔時師長曾語及芭蕉能治危急之疔症。然余從未實試。尚屬半疑。今則該症既無力服藥。此外確無挽救之術。預料不久定遭慘死。余姑爲除運用手術外。令服芭蕉根汁五大碗。次日來治。症情驟減。漫腫略束。身熱止而昏瞶除。漸呈景氣。殊出意外。再令照服。越四日而痊癒來鄙處道謝。上述二症。于嚴重之下。服芭蕉汁得能挽救。亦云幸矣。